



التمرين الأول :

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعمد مننظم $(\vec{o}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقط $A(2,0,-1)$ و $B(2,4,2)$ و $C(3,3,3)$ و الفلكة (S) التي معادلتها الديكارتية هي : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 8z + 20 = 0$ نبين أن مركز الفلكة (S) هي النقطة $(2,2,4)$ وأن شعاعها يساوي 2

$$\begin{aligned} \forall M(x, y, z) \in (S) &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 8z + 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 4x) + (y^2 - 4y) + (z^2 - 8z) + 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 4x + 4) - 4 + (y^2 - 4y + 4) - 4 + (z^2 - 8z + 16) - 16 + 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 2^2 \end{aligned}$$

. $R=2$ إذن مركز الفلكة (S) هي النقطة $(2, 2, 4)$ وشعاعها Ω

2) نبين أن معادلة ديكارتية للمستوى (P) هي : $x - y + z - 1 = 0$.
 معادلة المستوى (P) تكتب على الشكل $ax + by + cz + d = 0$ حيث $\vec{n}(a, b, c)$ متجهة منظمية عليه.

$$\overrightarrow{BC}(1,-1,1) \text{ و } C(3,3,3) \text{ ادنیا } B(2,4,2)$$

لدينا المستوى (P) عمودي على المستقيم (BC) إذن المتجهة $\overrightarrow{BC}(1, -1, 1)$ منتظمة على (P)
ومنه فإن معادلة (P) هي $x - y + z + d = 0$

لدينا المستوى (P) يمر من النقطة $A(2,0,-1)$ إذن $-0+(-1)+d=0$ أي $d=-1$

إذن معادلة ديكارتية للمستوى (P) هي :

لدينا معادلة ديكارتية للمستوى (P) هي : $x - y + z - 1 = 0$ ومركز الفلكة (S) هي النقطة $\Omega(2,2,4)$ أ - نبين أن المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) شعاعها يساوي 1.

$$R = 2 \quad \text{ولدينا} \quad d(\Omega, (P)) = \frac{|2 - 2 + 4 - 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \quad \text{لدينا}$$

بما أن $R \subset d(\Omega, P)$ يقطع الفاكهة (S) وفق دائرة (Γ) شاعها r حيث :

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{2^2 - \sqrt{3^2}} = \sqrt{4 - 3} = 1$$

بـ- نحدد تمثيلاً ياراً مترياً لل المستقيم (Δ) المار من Ω و العمودي على (P) :

لدينا معادلة ديكارتية للمستوى (P) هي : $x - y + z - 1 = 0$ إذن $\vec{n}(1, -1, 1)$ متجهة منتظمة عليه.
لدينا المستقيم (Δ) عمودي على (P) إذن $\vec{n}(1, -1, 1)$ موجهة للمستقيم (Δ) .

إذن التمثيل البارامتري للمستقيم (Δ) المار من النقطة $(4, 2, 2)$ و الموجه بالتجهيز $\vec{n}(1, -1, 1)$ هو:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

ج- نحدد مثلث إحداثيات النقطة ω مركز الدائرة (Γ) .

• مركز الدائرة (Γ) هي تقاطع (Δ) و (P).

$$\{\omega\} = (\Delta) \cap (P) \Leftrightarrow \omega \in (P) \text{ and } \omega \in (\Delta)$$

$$\Leftrightarrow (1): x - y + z - 1 = 0 \text{ , } (2): \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$$

$$(2+t) - (2-t)(2+t) - (2-t) + (4+t) - 1 = 0$$

$t = -1 \quad \underline{\quad} \quad \checkmark$

نوع (2) في (1) نحصل على

نوعض قيمة $t = -1$ في (2) نحصل على

إذن $\omega(1,3,3)$

$$\begin{cases} x = 2 + (-1) = 1 \\ y = 2 - (-1) = 3 \\ z = 4 + (-1) = 3 \end{cases}$$

التمرين الثاني:

يحتوي كيس على ثلاثة بيدقات بيضاء وأربع بيدقات سوداء (لا يمكن التمييز بين البيدقات باللمس).
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاثة بيدقات من الكيس.

لدينا $card(\Omega) = C_7^3 = 35$

(1) الحدث A "الحصول على بيدقتين بالضبط لونهما أبيض" أي (B,B,N)

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{12}{35} \quad \text{إذن} \quad card(A) = C_3^2 \cdot C_4^1 = 12$$

(2) الحدث B "الحصول على ثلاثة بيدقات من نفس اللون" أي (N,N,N) أو (B,B,B)

$$P(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \quad \text{إذن} \quad card(B) = C_3^3 + C_4^3 = 1 + 4 = 5$$

(3) الحدث C "الحصول على بيدقة بيضاء على الأقل"

الحدث المضاد \bar{C} "عدم الحصول على أية بيدقة بيضاء" يعني (البيدقات الثلاث المسحوبة سوداء)

$$\text{لدينا } P(\bar{C}) = \frac{card(\bar{C})}{card(\Omega)} = \frac{4}{35} \quad \text{إذن} : \quad card(\bar{C}) = C_4^3 = 4$$

$$\begin{aligned} p(C) &= 1 - p(\bar{C}) \\ &= 1 - \frac{4}{35} \\ &= \frac{31}{35} \end{aligned}$$

التمرين الثالث:

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بما يلي :

$u_0 = 2$ و $u_n = \frac{1}{5}(u_{n-1} - 4n - 1)$ لكل n من \mathbb{N} .

نضع $v_n = u_n + n - 1$ لكل n من \mathbb{N} .

(1) نبين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{5}$

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \quad v_{n+1} &= u_{n+1} + (n+1) - 1 \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 4n - 1) + n \\ &= \frac{1}{5}(u_n - 4n - 1 + 5n) \\ &= \frac{1}{5}(u_n + n - 1) \\ &= \frac{1}{5}v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها

. (2) أ - نحسب بدلالة n

لدينا $v_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n$ أي $v_n = v_0 \cdot q^n$ إذن $v_0 = u_0 + 0 - 1 = 2 - 1 = 1$ و $q = \frac{1}{5}$ و q وحدتها الأولى

ب- استنتاج u_n بدلالة n ثم حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$

$$u_n = \left(\frac{1}{5}\right)^n - n + 1 \quad \text{لدينا } v_n = u_n + n - 1 \quad \text{و منه فان } v_n = u_n + n - 1 \quad \text{لدينا}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \quad \text{لدينا} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-n + 1) = -\infty \quad \text{لدينا} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0 \quad \text{لدينا} \quad -1 < \frac{1}{5} < 1$$

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n \quad \text{و} \quad T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n \quad (3)$$

$$T_n = \frac{1}{4} \left(5 - \frac{1}{5^n} \right) : \text{نبين أن}$$

$$T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$$

$$= v_0 \cdot \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$= 1 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}}$$

$$= \frac{5}{4} \left(1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(5 - 5 \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(5 - 5 \cdot \frac{1}{5^{n+1}} \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(5 - \frac{1}{5^n} \right)$$

$$S_n = T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2} \quad \text{نبين أن}$$

لدينا $u_n = v_n - n + 1$: لدينا

$$\begin{aligned} S_n &= u_0 + u_1 + \dots + u_n \\ &= (v_0 - (-1)) + (v_1 - 0) + (v_2 - 1) + \dots + (v_n - (n-1)) \\ &= (v_0 + v_1 + \dots + v_n) - ((-1) + 0 + 1 + 2 + \dots + (n-1)) \\ &= T_n - \frac{((-1) + (n-1))(n+1)}{2} \\ &= T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2} \end{aligned}$$

التمرين الرابع:

$$(\sqrt{2} + 2i)^2 = -2 + 4\sqrt{2}i \quad (1) \quad \text{تحقق من أن}$$

$$\begin{aligned} (\sqrt{2} + 2i)^2 &= \sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2} \cdot 2i + (2i)^2 \\ &= 2 + 4\sqrt{2}i - 4 \\ &= -2 + 4\sqrt{2}i \end{aligned}$$

0,5

1

0,25

(2) نحل في مجموعة الأعداد العقدية \mathbb{C} المعادلة : $z^2 - (\sqrt{2} + 2)z + 2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 0$
لدينا مميز المعادلة هو

$$\begin{aligned}\Delta &= \left[-(\sqrt{2} + 2) \right]^2 - 4(2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i) \\ &= 2 + 4\sqrt{2} + 4 - 8 - 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i \\ &= -2 + 4\sqrt{2}i \\ &= (\sqrt{2} + 2i)^2\end{aligned}$$

إذن حل المعادلة هما: $z_1 = \frac{\sqrt{2} + 2 - (\sqrt{2} + 2i)}{2} = 1 - i$ و $z_2 = \frac{\sqrt{2} + 2 + (\sqrt{2} + 2i)}{2} = 1 + \sqrt{2} + i$

(3) لدينا العددان العقديان i و $z_1 = 1 - i$ و $z_2 = 1 + \sqrt{2} + i$

أ - نحدد الشكل المثلثي للعدد العقدي z_1

لدينا $|z_1| = |1 - i| = \sqrt{2}$ إذن

$$z_1 = 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$$

ب - نبين أن $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \bar{z}_2$ هو مرافق العدد z_2

لدينا :

$$\begin{aligned}z_1 \cdot z_2 &= (1 - i)(1 + \sqrt{2} + i) \\ &= 1 + \sqrt{2} + i - i - i\sqrt{2} + 1 \\ &= 2 + \sqrt{2} - i\sqrt{2} \\ &= \sqrt{2}(\sqrt{2} + 1 - i) \\ &= \sqrt{2}\bar{z}_2\end{aligned}$$

استنتاج : $\arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0[2\pi]$

لدينا $\arg(z_1) + \arg(z_2) \equiv \arg(\sqrt{2}) + \arg(\bar{z}_2)[2\pi]$ إذن $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \bar{z}_2$

و بما أن $\arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0[2\pi]$ فـ $\arg(\sqrt{2}) \equiv 0[2\pi]$ و $\arg(\bar{z}_2) \equiv -\arg(z_2)[2\pi]$

ج - نحدد عمدة للعدد z_2

$$\arg(z_2) \equiv -\frac{\pi}{8}[2\pi] \quad \text{لدينا} \quad \arg(z_1) \equiv -\frac{\pi}{4}[2\pi] \quad \text{و} \quad \arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0[2\pi]$$

مسألة :

(I) لدينا g الدالة العددية المعرفة على $[0, +\infty]$ بما يلي :

(1) نبين أن $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x}$ لكل x من $[0, +\infty]$ ثم نستنتج منحى تغيرات الدالة g على $[0, +\infty]$

1

0,5

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, +\infty[: g'(x) &= 1 + \frac{1}{x^2} - 2 \ln x \\ &= 1 + \frac{1}{x^2} - 2 \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2} \\ &= \frac{(x-1)^2}{x^2} \end{aligned}$$

لدينا لكل x من $]0, +\infty[$ و $(x-1)^2 \geq 0$

إذن $\forall x \in]0, +\infty[$ فإن الدالة g تزايدية على المجال $[0, +\infty[$

(2) لدينا الدالة g تزايدية على المجال $[0, +\infty[$ و خصوصاً على المجال $[0, 1]$ إذن

$$\forall x \in]0, 1] \Rightarrow 0 < x \leq 1 \Rightarrow g(x) \leq g(1)$$

بما أن $g(1) = 0$ فإن $g(x) \leq 0$ لكل x من المجال $]0, 1]$

لدينا الدالة g تزايدية على المجال $[1, +\infty[$ إذن $g(x) \geq g(1) = 0$ فـان $g(x) \geq 0$ لكل x من المجال $[1, +\infty[$

(II) الدالة العددية f المعرفة على $[0, +\infty[$ بما يلي :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sqrt{x}$ (يمكن وضع $t = \sqrt{x}$ ثم نحسب $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$) أ - نبين أن $x = t^2$ إذن $t = \sqrt{x}$ نضع

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{(\ln t^2)^2}{t^2} = \frac{(2 \ln t)^2}{t^2} = 4 \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2 = 0 \quad \text{لدينا} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$$

$$f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2 = x \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{لدينا} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$$

ب - نتحقق من أن $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$:

لـ x من $]0, +\infty[$ لدينا

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{1}{x} + \frac{1}{\frac{1}{x}} - \left(\ln\left(\frac{1}{x}\right) \right)^2 - 2 \\ &= \frac{1}{x} + x - (-\ln x)^2 - 2 \\ &= \frac{1}{x} + x - (\ln x)^2 - 2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

0,5

0,75

0,25

ج - حسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

0,5

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$$

فإن $t = \frac{1}{x}$ إذن عندما $x \rightarrow 0^+$ فإن $t \rightarrow +\infty$ و منه فإن

 إذن المنحنى (C) يقبل مقاربا رأسيا معادلته $y = 0$

 د - نبين أن (C) يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المقارب هو المستقيم الذي معادلته هي : $y = x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{(\ln x)^2}{x} - \frac{2}{x} \right) = 1 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{لدينا}$$

إذن (C) يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المقارب هو المستقيم الذي معادلته $y = x$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2 = -\infty$

$$(2) \text{ بين أن } f'(x) = \frac{g(x)}{x} \quad : \quad]0, +\infty[$$

0,5

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} - 2(\ln x)(\ln x)'$$

$$= 1 - \frac{1}{x^2} - 2(\ln x) \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x} - 2 \ln x \right)$$

$$= \frac{g(x)}{x}$$

 إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$


 جدول تغيرات الدالة f

1,5

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	\emptyset	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

(3) المنحنى

1



4) أ - نبين أن الدالة $G: x \ln x - x : g : x \rightarrow \ln x$ دالة أصلية لدالة $x \ln x - x$ على $[0, +\infty]$ لدينا 0,5

$$\forall x \in [0, +\infty] : G'(x) = x' \ln x + x(\ln x)' - 1$$

$$\begin{aligned} &= \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - 1 \\ &= \ln x + 1 - 1 \\ &= \ln x \end{aligned}$$

إذن الدالة G دالة أصلية لدالة g .

ب - باستعمال متكاملة بالأجزاء ، نبين أن : 2

$$\begin{cases} u'(x) = 2 \frac{\ln x}{x} \\ v(x) = x \end{cases} \quad \text{إذن} \quad \begin{cases} u(x) = (\ln x)^2 \\ v'(x) = 1 \end{cases} \quad \text{نضع}$$

إذن

$$\begin{aligned} \int_1^e (\ln x)^2 dx &= \left[x(\ln x)^2 \right]_1^e - \int_1^e 2 \frac{\ln x}{x} \cdot x dx \\ &= \left[x(\ln x)^2 \right]_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx \\ &= \left[x(\ln x)^2 \right]_1^e - 2 \left[x \ln x - x \right]_1^e \\ &= \left(e(\ln e)^2 - 1(\ln 1)^2 \right) - 2 \left((e \ln e - e) - (1 \ln 1 - 1) \right) \\ &= e - 2 \end{aligned}$$

ج - مساحة حيز المستوى المقصور (C) و محور الأفاسيل و المستقيمين اللذين معادلتهما : $x=1$ و $x=e$ لدينا f دالة موجبة و متصلة على المجال $[1, e]$ إذن المساحة المطلوبة هي 0,75

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e f(x) dx = \int_1^e \left(x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2 \right) dx \\ &= \int_1^e \left(x + \frac{1}{x} - 2 \right) dx - \int_1^e (\ln x)^2 dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} + \ln|x| - 2x \right]_1^e - (e - 2) \\ &= \left(\frac{e^2}{2} + \ln e - 2e \right) - \left(\frac{1}{2} + \ln 1 - 2 \right) - e + 2 \\ &= \frac{e^2}{2} + 1 - 2e - \frac{1}{2} + 2 - e + 2 \\ &= \frac{e^2}{2} - 3e + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

إذن $A = \frac{e^2}{2} - 3e + \frac{9}{2}$ بوحدة قياس المساحة